







每 100 毫升母乳含有 1.4-1.6 克蛋白質，而普通牛奶含有 3.5 克蛋白質，<sup>2,3</sup> 即普通牛奶的蛋白質含量比母乳高出約 3 倍。<sup>4-6</sup>



母乳的蛋白質含量會隨著月齡而下降，而普通牛奶的蛋白質含量則維持不變。Trend 顯示母乳的蛋白質含量在 3 個月後會下降，而 Single Plot 則顯示母乳的蛋白質含量在 6 個月後會下降。

母乳的蛋白質含量會隨著月齡而下降，而普通牛奶的蛋白質含量則維持不變。INFINIPRO<sup>®</sup> 含有 INFINI 成分，能幫助母乳的蛋白質含量維持在 3 個月後不會下降。<sup>9-10</sup> 母乳的蛋白質含量在 6 個月後會下降。<sup>4-6</sup>



- 8) Indrio, F., et al. (2014). JAMA Pediatric, 168 (3), 228-233.
- 9) Zhang, Z., et al. (2013). Nutrients, 5, 4800-4821.
- 10) Nestlé Internal data. (2020). Nestlé Research Centre.
- 11) Riechmann, E.R., et al. (2020). Nutr Hosp, 37(4), 698-706.
- 12) Sinkiewicz, G., Ljunggren, L. (2008). Microbial Ecology in Health and Disease, 20, 122-126.
- 13) Billeaud, C., et al. (1990). European Journal of Clinical Nutrition, 44(8), 577-583.

△

°

^

#

\*2'FL LNnT (HMO) 100 40.6

+

® ® 4 3