

每 100 毫升母乳含有 1.4-1.6 克蛋白質，而普通牛奶含有 3.5 克蛋白質，^{2,3} 即普通牛奶蛋白質含量比媽媽天然授乳分泌高出約 3 倍。⁴⁻⁶



母乳蛋白質含量會隨月齡而下降，而普通牛奶蛋白質含量則維持不變。Trend 顯示母乳蛋白質含量在 0-3 個月時最高，之後逐漸下降，到 6 個月後降至最低。Single Plot 顯示母乳蛋白質含量在 0-3 個月時最高，之後逐漸下降，到 6 個月後降至最低。

母乳蛋白質含量會隨月齡而下降，而普通牛奶蛋白質含量則維持不變。INFINIPRO[®] 含有 INFINI 成分，能幫助母乳蛋白質含量在 4-6 個月後維持穩定。⁹⁻¹⁰



90% 90% INFINIPRO®

Real-World Study 9 INFINIPRO®

HK\$150 #+ INFINIPRO® Possible <https://bit.ly/3tPCmJ6>

- 1) Leung, S.S.F., Lui, S. & Davies, D.P. (1988). Australian Paediatric Journal, 24, 186-190. Retrieved from: https://www.fhs.gov.hk/english/health_info/child/12146.html#p13
- 2) Martin, C. R., et al. (2016). Nutrients, 8(5), 279.
- 3) FAO. (2020). Milk Composition. Retrieved from: <http://www.fao.org/dairy-production-products/products/milk-composition/...>
- 4) Koletzko, B., et al. (2009). The American Journal of Clinical Nutrition, 89(Suppl), 1502S-1508S.
- 5) Luque, V., et al. (2016). Nutrition and metabolic insights, 8(Suppl 1), 49-56.
- 6) Koletzko, B., et al. (2009). The American Journal of Clinical Nutrition, 89(6), 1836-1845.
- 7) Papagaroufalos, K., et al. (2014). Nutrition and Metabolic Insights, 7,19-27.

- 8) Indrio, F., et al. (2014). JAMA Pediatric, 168 (3), 228-233.
- 9) Zhang, Z., et al. (2013). Nutrients, 5, 4800-4821.
- 10) Nestlé Internal data. (2020). Nestlé Research Centre.
- 11) Riechmann, E.R., et al. (2020). Nutr Hosp, 37(4), 698-706.
- 12) Sinkiewicz, G., Ljunggren, L. (2008). Microbial Ecology in Health and Disease, 20, 122-126.
- 13) Billeaud, C., et al. (1990). European Journal of Clinical Nutrition, 44(8), 577-583.

△

°

^

#

*2'FL LNnT (HMO) 100 40.6

+

® ® 4 3