



00

007000

1 min to read

1. 1990-2000 年中国人口增长

1990-2000 年中国人口增长 1.5 亿，BB 1990-2000 年中国人口增长 1.5 亿

2. 1990-2000 年中国人口增长

1990-2000 年中国人口增长 1.5 亿，BB 1990-2000 年中国人口增长 1.5 亿
1990-2000 年中国人口增长 1.5 亿，BB 1990-2000 年中国人口增长 1.5 亿
23% 1990-2000 年中国人口增长 1.5 亿

3. 1990-2000 年中国人口增长

1990-2000 年中国人口增长 1.5 亿，BB 1990-2000 年中国人口增长 1.5 亿

4. 1990-2000 年中国人口增长

1990-2000 年中国人口增长 1.5 亿，4-6 1990-2000 年中国人口增长 1.5 亿

1990-2000 年中国人口增长 1.5 亿，BB 1990-2000 年中国人口增长 1.5 亿

* 1990-2000 年中国人口增长 1.5 亿

5. 1990-2000 年中国人口增长

1990-2000 年中国人口增长 1.5 亿，3

6. 預防過敏性哮喘的藥物治療

預防性藥物治療^{4,5} 哮喘患者應定期使用吸入性類固醇以預防哮喘發作。對於輕度哮喘患者，每日使用低劑量吸入性類固醇是首選的預防性治療。對於中度至重度哮喘患者，每日使用中至高劑量吸入性類固醇是首選的預防性治療。

* 對於輕度哮喘患者，每日使用低劑量吸入性類固醇是首選的預防性治療。對於中度至重度哮喘患者，每日使用中至高劑量吸入性類固醇是首選的預防性治療。

7. 哮喘的長期管理

哮喘的長期管理目標是預防哮喘發作，減少哮喘對生活質量的影響，並防止哮喘導致不可逆轉的肺功能損害。長期管理應包括定期使用吸入性類固醇，並根據病情調整藥物劑量。

1. Chan, A. W. M., et al. (2015). Guidelines for Allergy Prevention in Hong Kong.
2. Salam, M. T., et al. (2006). *Annals of Epidemiology*, 16(5), 341-346.
3. Chan, A. W. M., et al. (2016). *Hong Kong Med J*, 22(3), 279-285.
4. Høst, A., et al. (1999). *Archives of Disease in Childhood*, 81(1), 80-84.
5. Høst, A., et al. (2008). *Pediatr Allergy Immunol*, 19(1), 1-4.